

ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN PEMBERIAN TERAPI MENENANGKAN (TERAPI DZIKIR) PADA PASIEN SKIZOFRENIA RESIKO PERILAKU KEKERASAN (RPK)

ABSTRAK

Xiii Halaman awal + 276 halaman inti

Vita Enia Ramadhona, Sutri Yani

Masalah utama gangguan jiwa didunia adalah *skizofrenia*, *skizofrenia* yaitu masalah pada gangguan otak dan pola pikir seseorang. Prevelensi *skizofrenia* di dunia mencapai 21 juta orang, salah satu gejala *skizofrenia* adalah risiko perilaku kekerasan. Risiko perilaku kekerasan dilakukan karena ketidakmampuan dalam melakukan koping terhadap stres, ketidakpahaman terhadap situasi sosial, tidak mampu untuk mengidentifikasi stimulus yang dihadapi, dan tidak mampu mengontrol dorongan untuk melakukan perilaku kekerasan. Apabila masalah tidak diatasi maka akan mengakibatkan risiko menciderai diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan. Tujuan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini untuk mengetahui gambaran pada pasien risiko perilaku kekerasan dengan *skizofrenia* dan mengetahui gambaran mengenai pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keperawatan, ditambah lagi dengan terapi komplementer dengan terapi dzikir. Studi dokumentasi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu kasus dengan memanfaatkan laporan asuhan keperawatan. Dari hasil studi dokumentasi diperoleh bahwa setiap proses keperawatan yang dilakukan pada kedua responden sudah sesuai dengan teori. Hasil studi kasus setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 12 hari latihan pasien mengontrol risiko perilaku kekerasan dengan menggunakan terapi dzikir dikatakan berhasil. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan asuhan keperawatan jiwa secara optimal dan sesuai SOP yang telah ada, serta dapat melakukan tindakan yang menjadi hambatan dan kesulitan selama penulis melakukan penelitian, yaitu berupa melaksanakan strategi pelaksanaan terhadap keluarga pasien, dan melakukan seluruh tindakan keperawatan sesuai dengan standar intervensi keperawatan indonesia.

Kata kunci: skizofrenia, risiko perilaku kekerasan, terapi dzikir

Daftar pustaka : (2008-2020)

NURSING CARE WITH SOLING THERAPY (DZIKIR THERAPY) TO SCHHIZOPHRENIC PATIENTS AT RISK OF VIOLENT BEHAVIOR (RPK)

ABSTRACT

Xiii Start page + 276 core pages

Vita Enia Ramadhona, Sutri Yani

The main problem of mental disorders in the world is schizophrenia, schizophrenia is a problem with brain disorders and a person's mindset. The prevalence of schizophrenia in the world reaches 21 million people, one of the symptoms of schizophrenia is the risk of violent behavior. The risk of violent behavior is carried out because of the inability to cope with stress, lack of understanding of social situations, unable to identify the stimulus faced, and unable to control the urge to commit violent behavior. If the problem is not addressed, it will result in the risk of injuring yourself, others or the environment.

The purpose of writing this Scientific Paper is to find out the description of the patient at risk of violent behavior with schizophrenia and to know the description of the assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation of nursing, coupled with complementary therapy with dhikr therapy. This documentation study uses a qualitative descriptive method that describes a case by utilizing nursing care reports. From the results of the documentation study, it was found that every nursing process carried out on the two respondents was in accordance with the theory. The results of the case study after nursing actions were carried out for 12 days of patient training to control the risk of violent behavior using dhikr therapy were said to be successful. For further researchers, it can be used as a refence or guideline in carrying out mental nursing care optimally and according to existing soups, and can take actions that become obstacles and difficulties during the author conducting research, namely in the form of implementing implementation strategies for the patient's family, and carrying out all nursing actions. In accordance with indonesia nursing intervention standards.

Keywords: schizophrenia, risk of violent behavior, dhikr therapy

Bibliography : (2008-2020)